

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 07 (SEMANA 34, DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 17 y 23 de agosto del 2026, se indica que:

- Los resultados del monitoreo reproductivo realizado por IFOP evidencian una **alta actividad reproductiva en sardina común y anchoveta**. En sardina común, se observa un claro predominio de hembras activas (estadios III y IV), **correspondientes a hembras con un avanzado desarrollo gonadal y en proceso reproductivo**. En anchoveta, se registra igualmente un alto predominio de hembras activas (estadios III y IV), lo que evidencia que el proceso reproductivo se mantiene activo en la población.

No obstante que la regla acordada establece que la veda se gatilla cuando el indicador biológico señalado se iguale o supere para ambas especies, durante este periodo se ha considerado la necesidad de mantener la veda reproductiva para sardina común y anchoveta en conjunto. Lo anterior en atención al carácter multiespecie de la pesquería y a lo indicado en la Ley General de Pesca y Acuicultura que señala en su artículo 1°B que el objetivo de la veda es la

conservación y el uso sustentable de los recursos, mediante la **aplicación del enfoque precautorio**, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquería, así como protección de procesos reproductivos y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan estos recursos.

En consecuencia, para las Regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía se **extiende el periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta, hasta la próxima evaluación semanal.**

- Para la Región de Los Ríos, se mantiene el periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta.

Conforme a lo anterior, se indica que, entre las Regiones de Valparaíso a La Araucanía, se **mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta**, la cual será evaluada en el próximo reporte del jueves 03 de septiembre, el cual será publicado en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)	36°25'24" - 72°56'42" 36°30'24" - 72°55'42"	Vegas de Itata La Angostura	S. Común 63,5% Anchoveta 36,5%	S. COMÚN	23,6	1	23,6	324	8,5 - 18,0	14,0	25,6	0,3	PINV. 1 viaje (3 lances). Recurso escaso.
					ANCHOVETA	13,4		13,4	322	8,0 - 19,5	13,0	27,4		
	Biobío (B. Concepción)	36°38'48" - 72°59'48" 36°39'48" - 73°00'06"	Piedra Quebrola Pta. de Parra	S. Común 48,1% Anchoveta 51,9%	S. COMÚN	5,7	1	5,7	106	9,0 - 16,0	11,0	56,6	0,0	PINV. 1 viaje (2 lances, 1 sin pesca). Recursos escaso. En lance 1 se observa agregación dispersa (20 a 25 m). Recurso se va a pique, escapándose de la red.
					ANCHOVETA	6,3		6,3	105	9,5 - 14,5	12,0	40,0		
	Biobío (G. de Arauco)	37°01'00" - 73°29'12" 37°10'24" - 73°23'06"	I. Sta. María Playa Arauco	S. Común 85,1% Anchoveta 14,9%	S. COMÚN	22,6	1	22,6	215	10,0 - 17,5	16,0	6,3	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances (uno sin pesca). Recurso escaso. En lance 3, fondo rocoso produce rotura de red..
					ANCHOVETA	4,4		4,4	114	8,0 - 18,0	12,0	30,7		
	Total Ñuble-Biobío	36°25'24" - 72°56'42" 37°10'24" - 73°23'06"	Vegas de Itata Playa Arauco	S. Común 67,8% Anchoveta 32,2%	S. COMÚN	51,9	3	17,3	645	8,5 - 18,0	14,0	20,6	0,1	PINV. 3 viajes: (8 lances, 2 sin pesca). Recurso escaso en toda la macrozona.
					ANCHOVETA	24,1		8,0	541	8,0 - 19,5	12,0	31,3		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°19'30" - 73°16'26" 39°21'02" - 73°18'52"	Cayulfu Playa Queule	S. Común 84,6% Anchoveta 7,7% Pampanito 7,7%	S. COMÚN	92,0	1	92,0	243	8,5 - 16,0	10,5	73,4	0,3	PINV 1 viaje (2 lances). No se concreta un tercer lance, debido al aumento de oleaje y corrientes en la zona. Presencia de cabrilla, pejerrey, lenguado, pejegallo, calamar y pampanito, en el virado de la red.
					ANCHOVETA	4,0		4,0	123	8,5 - 15,5	10,5	73,2		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°31'48" - 73°18'28" 39°35'58" - 73°20'16"	Chanchán Piedra Blanca	S. Común 56,0% Anchoveta 44,0%	S. COMÚN	56,0	1	56,0	199	8,0 - 12,0	11,0	89,4	1,5	PINV. 1 viaje (2 lances). Recurso escaso. Se realiza esfuerzo de búsqueda durante transecta entre sector Pilolcura Hacia Bahía de Corral, sin resultados.. Presencia de camarón nylon en lance 1.
					ANCHOVETA	44,0		44,0	203	9,0 - 14,0	10,5	80,4		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	158	8,3	Inactivas: 0,6% III : 89,2% IV: 10,1% V: -	99,4%	240	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	119	7,1	Inactivas: 5,0% III : 92,4% IV: 2,5% V: -	95,0%	154	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	180	6,8	Inactivas: 7,8% III : 91,1% IV: 1,1% V: -	92%	180	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	388	7,5	Inactivas: 2,6% III : 92,0% IV: 5,4% V: -	97,4%	574	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	100	3,8	Inactivas: 53,0% III : 46,0% IV: - V: 1,0%	46,0%	160	Actividad reproductiva moderada.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	96	2,9	Inactivas: 72,9% III : 15,6% IV: 9,4% V: 2,1%	25,0%	160	Actividad reproductiva baja.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	150	4,9	Inactivas: 20,0% III : 69,3% IV: 8,7% V: 2,0%	78,0%	264	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	105	3,9	Inactivas: 21,0% III : 72,4% IV: 6,7% V: -	79,0%	139	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	65	5,5	Inactivas: - III : 100% IV: - V: -	100%	82	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	320	4,8	Inactivas: 16,3% III : 76,6% IV: 6,3% V: 0,9%	82,8%	485	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	49 ^(*)	2,4	Inactivas: 73,5% III : 26,5% IV: - V: -	26,5%	90	Actividad reproductiva baja.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	98	2,0	Inactivas: 77,6% III : 21,4% IV: 1,0% V: -	22,4%	160	Actividad reproductiva baja.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L1	148	36°29'36" - 72°58'00"	Ñuble (Itata)	S. Común	8,7	10,0 - 16,5	14,0	4,8	0,0	9,2	100	39	800
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L1	148	36°29'36" - 72°58'00"		Anchoqueta	4,3	10,0 - 19,5	16,0	1,9	-	5,2	92,1	34	750
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L2	149	36°25'24" - 72°56'42"		S. Común	6,4	10,0 - 18,0	14,0	8,3	0,0	9,3	100,0	39	750
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L2	149	36°25'24" - 72°56'42"		Anchoqueta	5,6	10,5 - 18,0	13,0	15,7	-	5,7	100,0	49	750
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L3	150	36°30'24" - 72°55'42"		S. Común	8,5	8,5 - 15,5	10,5	59,8	0,9	6,5	98,3	72	750
L/M Capello	733	17,1	18-ago 14:45	Tomé	embarque L3	150	36°30'24" - 72°55'42"		Anchoqueta	3,5	8,0 - 18,0	11,0	77,6	-	2,9	45,1	56	700
L/M Capello	733	17,1	18-ago 20:40	Talcahuano	embarque L1	151	36°38'48" - 72°59'48"	Biobío (B. Concepción)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	18-ago 20:40	Talcahuano	embarque L2	152	36°39'48" - 73°00'06"		S. Común	5,7	9,0 - 16,0	11,0	56,6	0,0	7,1	95,0	76	850
L/M Capello	733	17,1	18-ago 20:40	Talcahuano	embarque L2	152	36°39'48" - 73°00'06"		Anchoqueta	6,3	9,5 - 14,5	12,0	40,0	-	3,9	79,0	82	850
L/M Capello	733	17,1	19-ago 18:13	San Vicente	embarque L1	153	37°05'18" - 73°12'00"	Biobío (G. de Arauco)	S. Común	10,6	10,0 - 17,0	12,0	9,2	0,0	6,8	94,6	35	700
L/M Capello	733	17,1	19-ago 18:13	San Vicente	embarque L1	153	37°05'18" - 73°12'00"		Anchoqueta	4,4	8,0 - 18,0	12,0	30,7	-	5,5	100,0	62	650
L/M Capello	733	17,1	19-ago 18:13	San Vicente	embarque L2	154	37°10'24" - 73°23'06"		S. Común	12,0	10,5 - 17,5	16,0	3,8	0,0	6,9	100,0	26	600
L/M Capello	733	17,1	19-ago 18:13	San Vicente	embarque L3	155	37°01'00" - 73°29'12"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juan M S	3598	17,9	18-ago 16:30	Mehuín	embarque L1	156	39°21'02" - 73°18'52"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	42,0	8,5 - 16,0	10,5	72,7	0,8	4,2	56,4	105	1.000
Juan M S	3598	17,9	18-ago 16:30	Mehuín	embarque L1	156	39°21'02" - 73°18'52"		Anchoqueta	4,0	8,5 - 15,5	10,5	73,2	-	2,4	26,5	153	1.000
Juan M S	3598	17,9	18-ago 16:30	Mehuín	embarque L2	157	39°19'30" - 73°16'26"		S. Común	50,0	9,0 - 12,5	10,5	73,9	0,0	3,3	33,3	103	1.000
Juan M S	3598	17,9	19-ago 14:07	Corral	embarque L1	158	39°35'58" - 73°20'16"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	23,0	8,0 - 12,0	10,5	89,8	1,1	1,9	19,6	142	1.000
Juan M S	3598	17,9	19-ago 14:07	Corral	embarque L1	158	39°35'58" - 73°20'16"		Anchoqueta	27,0	9,0 - 13,0	10,5	84,6	-	1,7	19,6	163	1.000
Juan M S	3598	17,9	19-ago 14:07	Corral	embarque L2	159	39°31'48" - 73°18'28"		S. Común	33,0	8,0 - 12,0	11,0	89,2	1,8	3,6	30,0	124	1.000
Juan M S	3598	17,9	19-ago 14:07	Corral	embarque L2	159	39°31'48" - 73°18'28"		Anchoqueta	17,0	9,5 - 14,0	11,0	73,7	-	2,4	25,5	151	1.000

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín Nº 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 14 : semana 34 (17 al 23 de agosto 2026)

6.- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)