

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 09 (SEMANA 36, DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 31 de agosto al 06 de septiembre del 2026, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se mantiene la veda semanal. Lo anterior en consideración a que los indicadores reproductivos evidencian una alta actividad reproductiva.
- Para las regiones de La Araucanía y Los Ríos, se suspende la veda reproductiva a partir de las 00:00 horas del viernes 11 de septiembre del presente.

Conforme a lo anterior, se indica que, entre la Región de Valparaíso a la Región del Biobío, se **mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta**, la cual será evaluada en el próximo reporte de la próxima semana, el cual será publicado en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso				S. COMÚN									Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)	36°22'36" - 72°52'42" 36°24'24" - 72°53'12"	Río Itata Vegas de Itata	S. Común 33,1% Anchoqueta 66,9%	S. COMÚN	13,3	1	13	311	10,0 - 17,0	14,0	5,7	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances. Recurso disponible de 5 a 10 m de profundidad. Alta presencia de aves y lobos marinos en la zona.
					ANCHOVETA	29,7		30	335	9,5 - 19,5	17,0	0,7		
	Biobío (B. Concepción)	36°37'54" - 73°09'00" 36°38'06" - 72°58'48"	Tumbes Tome	S. Común 67,3% Anchoqueta 31,1% Mote 1,6%	S. COMÚN	4,0	1	4	137	9,5 15,0	14,0	19,5	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances. Recursos escaso. Primer lance sin pesca, se observa agregación dispersa.
					ANCHOVETA	12,9		13	179	10,5 - 14,5	12,0	33,1		
	Biobío (G. de Arauco)	36°47'06" - 73°14'12" 37°07'42" - 73°36'06"	Pta. Cullintos Pta. Lavapié	S. Común 47,5% Anchoqueta 52,5%	S. COMÚN	13,4	2	13	225	9,0 - 16,5	11,0	30,3	0,0	PINV. 2 viajes: 4 lances. Primer viaje sin pesca (2 lances). Recurso se encontraba bajo los 20 m). En un segundo viaje, se concretan 2 lances efectivos.
					ANCHOVETA	14,6		15	208	9,5 - 18,0	14,0	6,1		
	Total Ñuble-Biobío	36°22'36" - 72°52'42" 37°07'42" - 73°36'06"	Río Itata Pta. Lavapié	S. Común 44,3% Anchoqueta 55,4% Mote 0,3%	S. COMÚN	30,7	4	10	673	9,0 - 17,0	14,0	18,2	0,0	PINV. Recurso escaso. 3 viajes: 10 lances, 3 sin pesca. (un viaje sin pesca)
					ANCHOVETA	57,2		19	722	9,5 - 19,5	14,0	9,4		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°20'36" - 73°16'30" 39°22'36" - 73°17'42"	Playa Queule Pta. Ronca	S. Común 80,0% Anchoqueta 19,0% Pejerrey 1,0%	S. COMÚN	80,0	1	80	413	7,5 - 12,0	10,5	95,7	29,9	PINV 1 viaje, 2 lances. Búsqueda del recurso en zona contigua al límite sur de la región. Presencia de fuertes corrientes en la zona.
					ANCHOVETA	19,0		19	175	7,0 - 11,5	9,5	100,0		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°44'30" - 73°25'00"	Curiñanco	S. Común 3,3% Anchoqueta 6,1% Pampanito 82,4% Pejerrey 8,2%	S. COMÚN	1,6	1	2	56	5,5 - 11,5	8,0	98,2	78,6	PINV. 1 viaje, 1 lance. Se recorre la zona desde Mehuín al sur de Río Chaihuín, constatando una baja abundancia del recurso objetivo. Se realiza lance frente a playa Curiñanco, con muestra en mal estado debido a la presencia de un lobo marino atrapado en la red.
					ANCHOVETA	3,1		3	91	8,0 - 11,5	9,0	100,0		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	167	7,5	Inactivas: 0,6% III : 94,6% IV: 4,8% V: -	99,4%	288	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	112	7,3	Inactivas: - III : 92,9% IV: 7,1% V: -	100%	156	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	90	7,0	Inactivas: 10,0% III : 90,0% IV: - V: -	90,0%	160	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	369	7,3	Inactivas: 2,7% III : 93,0% IV: 4,3% V: -	97,3%	604	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	101	1,6	Inactivas: 86,1% III : 12,9% IV: - V: 1,0%	12,9%	160	Actividad reproductiva baja.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	12 ^(*)	1,9	Inactivas: 83,3% III : 16,7% IV: - V: -	16,7%	56	Actividad reproductiva baja.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	150	6,0	Inactivas: - III : 97,3% IV: 2,7% V: -	100%	276	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	139	6,7	Inactivas: - III : 87,8% IV: 12,2% V: -	100%	208	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	88	5,9	Inactivas: 3,4% III : 93,2% IV: 3,4% V: -	96,6%	160	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	377	6,2	Inactivas: 0,8% III : 92,8% IV: 6,4% V: -	99,2%	644	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	55	1,8	Inactivas: 94,5% III : 5,5% IV: - V: -	5,5%	80	Actividad reproductiva baja.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	40 ^(*)	0,8	Inactivas: 97,5% III : 2,5% IV: - V: -	2,5%	91	Actividad reproductiva baja.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	1	160	36°23'42" - 72°53'36"	Ñuble (Itata)	S. Común	10,0	10,0 - 17,0	14,0	5,0	0,0	6,6	100	35	750
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	1	160	36°23'42" - 72°53'36"		Anchoqueta	3,0	9,5 - 18,0	13,5	6,5	-	5,7	100	40	800
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	2	161	36°22'36" - 72°52'42"		S. Común	1,8	10,0 - 16,0	14,0	3,8	0,0	8,4	98,4	-	-
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	2	161	36°22'36" - 72°52'42"		Anchoqueta	13,2	12,5 - 18,5	17,0	0,0	-	5,9	100	25	750
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	3	162	36°24'24" - 72°53'12"		S. Común	1,5	10,0 - 16,5	14,0	12,8	0,0	7,8	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	01-sept 12:34	830	3	162	36°24'24" - 72°53'12"		Anchoqueta	13,5	12,0 - 19,5	13,0	0,0	-	6,3	100	35	800
L/M Capello	733	17,1	31-ago 20:00	28	1	163	36°37'54" - 73°09'00"	Biobío (B. Concepción)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	31-ago 20:00	28	2	164	36°37'54" - 72°59'24"		S. Común	0,2	9,5 - 12,0	11,0	75,0	0,0	12,5	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	31-ago 20:00	28	2	164	36°37'54" - 72°59'24"		Anchoqueta	0,7	11,0 - 14,0	12,0	19,4	-	6,6	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	31-ago 20:00	28	3	165	36°38'06" - 72°58'48"		S. Común	3,8	9,5 - 15,0	14,0	16,5	0,0	7,1	100	42	800
L/M Capello	733	17,1	31-ago 20:00	28	3	165	36°38'06" - 72°58'48"		Anchoqueta	12,2	10,5 - 14,5	12,0	33,9	-	6,8	100	70	800
L/M Capello	733	17,1	02-sept 17:00	29	1	166	37°04'30" - 73°27'59"	Biobío (G. de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	02-sept 17:00	29	2	167	36°47'06" - 73°14'12"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	06-sept 18:34	29	1	168	37°07'18" - 73°34'24"		S. Común	12,0	9,5 - 16,5	11,5	25,6	0,0	7,8	100	44	850
L/M Capello	733	17,1	06-sept 18:34	29	1	168	37°07'18" - 73°34'24"		Anchoqueta	2,0	9,5 - 17,0	13,5	20,4	-	5,7	97,6	-	-
L/M Capello	733	17,1	06-sept 18:34	29	2	169	37°07'42" - 73°36'06"		S. Común	1,4	9,0 - 14,5	11,0	70,4	0,0	4,6	76,9	-	-
L/M Capello	733	17,1	06-sept 18:34	29	2	169	37°07'42" - 73°36'06"		Anchoqueta	12,6	11,0 - 18,0	14,0	3,8	-	6,0	95,7	43	750
Juan M S	3598	17,9	03-sept 14:31	927	1	170	39°20'36" - 73°16'30"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	40,0	7,5 - 11,0	8,0	100	58,3	1,3	0,0	173	1.000
Juan M S	3598	17,9	03-sept 14:31	927	1	170	39°20'36" - 73°16'30"		Anchoqueta	9,0	7,0 - 11,0	9,0	100	-	-	-	-	-
Juan M S	3598	17,9	03-sept 14:31	927	2	171	39°22'36" - 73°17'42"		S. Común	40,0	8,0 - 12,0	10,5	91,4	1,5	1,8	25,5	104	1.000
Juan M S	3598	17,9	03-sept 14:31	927	2	171	39°22'36" - 73°17'42"		Anchoqueta	10,0	9,0 - 11,5	9,5	100	-	1,8	5,5	-	-
Juan M S	3598	17,9	04-sept 13:30	39	1	172	39°44'30" - 73°25'00"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	1,6	5,5 - 11,5	8,0	98,2	78,6	1,9	16,7	MME	-
Juan M S	3598	17,9	04-sept 13:30	39	1	172	39°44'30" - 73°25'00"		Anchoqueta	3,1	8,0 - 11,5	9,0	100	-	0,8	2,5	MME	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 16 : semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del indice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)