

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 14 (SEMANA 41, DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 05 al 11 de octubre de 2026, se indica que, entre las regiones de Ñuble y Biobío, el recurso anchoveta presenta un IGS de 6,2%. Para sardina común no se dispone de información, situación que se replica entre las Regiones de Valparaíso al Maule.

- En consecuencia, entre las Regiones de Valparaíso y Biobío, conforme al enfoque precautorio establecido en el D. Ex. N° 129/2024 (art. 9), **se extiende la veda reproductiva, de los recursos sardina común y anchoveta, hasta la próxima evaluación semanal.**
- Para las regiones de La Araucanía y Los Ríos se mantiene abierta la temporada de pesca.

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													
	Ñuble (Itata)	36°25'12" - 72°54'24" 36°27'28" - 72°56'52"	Alto Perales Clta. Burca	Anchoveta 100%	ANCHOVETA	150,0	1	150,0	305	13,0 - 19,5	17,5	0,0		PINV. 1 viaje, 3 lances. Baja disponibilidad del recurso. Tipo de agregación dispersa. Ausencia de sardina común en lances.
	Biobío (B. Concepción)	36°36'50" - 73°00'49" 36°40'32" - 73°04'21"	Los Bagres Faro Belén	Anchoveta 96,0% Bagre del norte 1,6% Pejerrey 2,4%	ANCHOVETA	48,0	1	48,0	102	13,5 - 19,5	17,5	0,0		PINV. 1 viaje, 3 lances (2 sin pesca) Baja disponibilidad del recurso. Tipo de agregación dispersa. Ausencia de sardina común en lances.
	Biobío (G. de Arauco)	36°47'12" - 73°12'12" 37°07'06" - 73°34'42"	Clta. Burro Pta. Lavapié	Anchoveta 100%	ANCHOVETA	50,0	1	50,0	144	8,0 - 13,0	10,0	97,2		PINV. 1 viaje, 3 lances (2 sin pesca) Baja disponibilidad del recurso. Tipo de agregación dispersa. Ausencia de sardina común en lances.
	Total Ñuble-Biobío	36°25'12" - 72°54'24" 37°07'06" - 73°34'42"	Alto Perales Pta. Lavapié	Anchoveta 99,2% Bagre del norte 0,3% Pejerrey 0,5%	ANCHOVETA	248,0	3	82,7	551	8,0 - 19,5	17,5	19,6		PINV. 3 viaje, 9 lances (4 sin pesca) Baja disponibilidad del recurso, se detecta sobre 20 m de profundidad. Tipo de agregación dispersa. Ausencia de sardina común en todos lances. Condiciones climáticas adversas durante la semana.
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin información de pesca comercial. Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)													Sin información de pesca comercial. Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble - Biobío						Ausencia de sardinana común en lances.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	157	6,2	Inactivas: - III : 100% IV: - V: -	100%	160	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	85 ^(*)	7,1	Inactivas: - III : 98,8% IV: 1,2% V: -	100%	120	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	67	1,3	Inactivas: 97,0% III : 3,0% IV: - V: -	3,0%	111	Actividad reproductiva baja.
	Total Ñuble - Biobío	309	6,2	Inactivas: 21,0% III : 78,6% IV: 0,3% V: -	79,0%	391	Actividad reproductiva alta.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín Nº 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (Nº / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	08-oct 14:30	San Vicente	embarcado L1	223	36°27'28" - 72°56'52"	Ñuble (Itata)	Anchoveta	50,0	13,0 - 19,0	17,5	0,0	-	6,2	100	42	950
L/M Capello	733	17,1	08-oct 14:30	San Vicente	embarcado L2	224	36°26'47" - 72°54'49"		Anchoveta	50,0	14,0 - 18,5	17,5	0,0	-	6,3	100	46	950
L/M Capello	733	17,1	08-oct 14:30	San Vicente	embarcado L3	225	36°25'12" - 72°54'24"		Anchoveta	50,0	13,5 - 19,5	17,5	0,0	-	6,1	100	38	900
L/M Capello	733	17,1	08-oct 8:30	Coliumo	embarcado L1	226	36°40'32" - 73°04'21"	Biobío (B. Concepción)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-oct 8:30	Coliumo	embarcado L2	227	36°38'13" - 73°02'11"		Anchoveta	48,0	13,5 - 19,5	17,5	0,0	-	7,1	100	28	900
L/M Capello	733	17,1	08-oct 8:30	Coliumo	embarcado L3	228	36°36'50" - 73°00'49"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	09-oct 18:30	San Vicente	embarcado L1	229	37°07'06" - 73°34'42"	Biobío (G. de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	09-oct 18:30	San Vicente	embarcado L2	230	36°50'06" - 73°10'42"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	09-oct 18:30	San Vicente	embarcado L3	231	36°47'12" - 73°12'12"		Anchoveta	50,0	8,0 - 13,0	10,0	97,2	-	1,3	3,0	56	900

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140


MME: muestra en mal estado.
MI: muestra insuficiente.
VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 21 : semana 41 (05 al 11 de octubre 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)