

**REPORTE MONITOREO – PROCESO REPRODUCTIVO DE
ANCHOVETA
REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y
ANTOFAGASTA
Semana N° 43 (19 - 25 octubre 2026)
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026**

1. **Objetivo:** Evaluar la condición reproductiva semanal de anchoveta (*Engraulis ringens*) el área marítima comprendida en las Regiones de Arica y Parinacota (AyP), de Tarapacá (TPCA) y de Antofagasta (ANTOF), para determinar si corresponde activar o mantener la veda biológica de reproducción (desove), en el marco del Decreto Exento N° 749/2013.

2. **Marco normativo y definiciones operativas**

- 2.1. **Marco normativo.** El periodo referencial de monitoreo y eventual aplicación de la veda biológica reproductiva se extiende entre el **01 de junio hasta el 31 de enero del año calendario siguiente**. La veda se activa cuando, en dos semanas del período referencial (sean o no consecutivas), se verifica simultáneamente (**IGS $\geq$ 6%** e **IAD $\geq$ 25%**). Si al 24 de agosto no se activa por indicadores, rige veda fija (25 de agosto - 8 de octubre). Existe veda complementaria de 10 días si, posterior a la veda, se verifica **IAD $\geq$ 35%**.

- 2.2. **Antecedentes Semana N°43/2026.** no se contó con ejemplares para el análisis histológico gonadal, debido a la ausencia de capturas del recurso por mal ambiente de pesca.

- 2.3. **Evaluación y decisión de administración:**

En consecuencia, **se mantiene abierta la temporada de pesca** en el área marítima comprendida en las Regiones de AyP-TPCA-ANTOF, sin perjuicio del seguimiento semanal y de la aplicación inmediata de la veda continua o semanal si el IFOP reporta el cumplimiento del indicador.

3. **Próximos reportes.** Los reportes se publicarán semanalmente, preferentemente los viernes, en el sitio institucional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (www.subpesca.cl). La vigencia de cualquier veda efectiva (continua o semanal) comenzará el día subsiguiente a la publicación del reporte respectivo.

2026

Informe semana N° 43

(19 al 25 octubre 2026)

Monitoreo reproductivo anchoveta.
Regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. Programa de
Seguimiento de las Pesquerías
Pelágicas Zona Norte, año 2026.

Subsecretaría de Economía y EMT

Octubre, 2026.





Informe Semana 43 **(19 al 25 octubre 2026)**

Convenio de Desempeño 2026

Monitoreo reproductivo anchoveta. Regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. Programa de Seguimiento de las
Pesquerías Pelágicas Zona Norte, año 2026.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / octubre 2026.

Requirente

**Subsecretaría de Economía y
Empresas de Menor Tamaño**

Subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño
Karlfranz Koehler Duncker

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Luis Parot Donoso

Jefe División Investigación Pesquera
Jorge Castillo Pizarro

Jefa de Proyecto
Carola Hernández Santoro

Autor

Eduardo Díaz Ramos

Colaboradores

*María García Ossandón
Francisco Lagos Villarroel*

Monitoreo reproductivo de anchoveta en la zona Arica-Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento macroscópico (mediante el IGS) y microscópico (mediante el IHA, IAD e IAO) de la evolución semanal del proceso de maduración gonadal y de desove de anchoveta en la zona norte. A partir de la semana 23 (1 al 7 de junio, 2026) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo entre las regiones de Arica - Parinacota y Antofagasta, que comprende el periodo entre junio 2026 y enero 2027.

En la Semana 43, no se contó con ejemplares para el análisis histológico gonadal, debido a la ausencia de capturas del recurso por mal ambiente de pesca (**Tabla 1**). En la zona de Arica, el total de 15 embarcaciones que zarparon el 19 de octubre recalieron sin pesca. El resto de la semana se mantuvieron en puerto. En Iquique y Antofagasta, la flota en puerto. Condiciones de anomalías oceanográficas en la zona norte, asociadas a la ocurrencia del evento El Niño, podrían afectar la distribución del recurso y, en consecuencia, su disponibilidad a la actividad extractiva comercial.

Tabla 1

Resumen de actividad pesquera comercial sobre anchoveta, por puerto de descarga, semana 43

Puerto	Flota	Captura (t)	N° embarcación			
			Con pesca anchoveta	Muestreadas con obtención gónadas	Muestreo descarga obtención gónadas	Muestreo abordó obtención gónadas
Arica	IND	0	0	0	0	0
	ART	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0
Iquique	IND	0	0	0	0	0
	ART	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0
Mejillones	IND	0	0	0	0	0
	ART	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0
ZONA NORTE	IND	0	0	0	0	0
	ART	0	0	0	0	0
	TOT	0	0	0	0	0

En el 2026, el monitoreo reproductivo a la fecha se sustentó mayoritariamente en ejemplares menores a 14,0 cm, recolectados principalmente de la actividad extractiva artesanal en la zona de Arica. Desde junio, los indicadores mostraron el incremento de la actividad ovárica (IHA; IGS), evidenciándose a fines de septiembre, en ejemplares recolectados en Arica a partir de la pesca de investigación, la persistencia de la maduración gonadal, con alta incidencia de desove (**Tabla 2; Figura 1**).

Tabla 2

Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta.

Semana (N°)	Fecha	Anchoveta de la zona norte									
		Macroscópico		Microscópico			Proporción (%) tamaños (cm)				
		IGS	n	IHA	IAD	IAO	n	≤ 11,5	12,0-13,5	14,0-15,5	≥ 16,0
23	01/06 - 07/06	1,9	364	46	5,7	0,3	315	12	84	4	0,0
24	08/06 - 14/06	2,5	247	74	12,2	0,7	288	20	77	3	0,0
25	15/06 - 21/06	2,5	224	70	5,2	2,3	306	29	67	4	0,0
26	22/06 - 28/06	SIN MUESTRAS									
27	29/06 - 05/07	3,5	73	94	2,8	4,7	107	32	68	0	0,0
28	06/07 - 12/07	3,8	298	92	9,5	5,8	346	28	69	3	0,0
29	13/07 - 19/07	4,1	247	95	3,8	1,7	293	18	80	2	0,0
30	20/07 - 26/07	5,8	271	98	16,0	0,9	331	20	76	4	0,0
31	27/07 - 02/08	4,4	262	98	27,8	2,3	345	32	65	3	0,0
32	03/08 - 09/08	4,2	210	97	6,9	1,9	318	34	65	1	0,0
33	10/08 - 16/08	4,2	93	99	9,7	0,6	175	47	53	0	0,0
34	17/08 - 23/08	3,8	141	99	15,2	1,3	297	53	47	0	0,0
35	24/08 - 30/08	VEDA BIOLOGICA									
36	31/08 - 06/09	VEDA BIOLOGICA									
37	07/09 - 13/09	VEDA BIOLOGICA									
38	14/09 - 20/09	VEDA BIOLOGICA									
39	21/09 - 27/09	VEDA BIOLOGICA									
40*	28/09 - 04/10	5,0	92	98	28,7	2,3	300	59	41	0	0,0
41*	05/10 - 11/10	7,0	14	100	14,3	0,0	28	48	52	0	0,0
42	12/10 - 18/10	SIN MUESTRAS									
43	19/10 - 25/10	SIN MUESTRAS									

IGS: hembras ≥ 12,0 cm, no hidratadas; (*) muestras de la PINV MPDH




Figura 1 Indicadores reproductivos: a) índice gonadosomático (IGS); b) hembras activas (IHA); c) Índice de Actividad de Desove (IAD); d) Índice de Atresia Ovárica (IAO). Los círculos en color indican los años respectivos (2025 y 2026), y las líneas segmentadas señalan los umbrales 5 %, 90 % y 25 % para IGS, IHA e IAD, respectivamente.

Glosario:

Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario producto del desarrollo de los ovocitos.

Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histológico), como una proporción de hembras que evidencian algún grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.

Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histológico), como una proporción de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV (hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).

Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva (>50 %), que refleja la finalización del evento reproductivo o algún factor perturbador del proceso de maduración gonadal y del desove.

Contribuimos a la
sostenibilidad de los
recursos marinos de Chile.



 www.ifop.cl

 info@ifop.cl

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO - CHILE