



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 41

(XV, I, II REGIONES)

(7 al 13 octubre 2013)

Convenio I: Asesoría Integral para la Pesca y Acuicultura, 2013

Proyecto 1.10. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / Octubre 2013

REQUIRENTE

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretario de Economía
Tomás Flores Jaña

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación Pesquera
Jorge Castillo Pizarro

Director Ejecutivo
José Luis Blanco García

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento microscópico de la evolución de la actividad de desove semanal de este recurso, monitoreo que se realiza a través del análisis histológico de muestras de ovarios de ejemplares provenientes de diferentes zonas de pesca. En la semana 23 (3 al 9 junio, 2013) se dio inicio al monitoreo reproductivo de la anchoveta entre la XV y II Región.

Se entregan resultados de 199 hembras muestreadas en la **semana 41** (7 al 13 octubre, 2013) provenientes de la Zona de Arica (5 millas frente al puerto de Arica y 11 millas de Punta Cuevas), de la Zona de Iquique (13 millas de caleta Mejillones del Norte, 7 y 10 millas de Punta Colorada) y de la Zona de Antofagasta (16 millas de Punta del Urcu y 5 millas de Punta Baja).

La distribución de fases microscópicas mostró el predominio de ovarios en condición de desove (EMS 6 a 8), con aporte importante de las fases de desarrollo avanzado (EMS 4 y 5). No se observaron hembras en vitelación inicial (EMS 3) y en regeneración (EMS 2). Los resultados mostraron ovarios con alta incidencia de desove (**Tabla 1**).

Tabla 1

Incidencia de fases microscópicas de madurez de ovarios de anchoveta. Zona Arica-Antofagasta, semana 41.

	Fases ováricas microscópicas									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n	0	0	0	51	74	3	0	71	0	199
%	0,0	0,0	0,0	25,6	37,2	1,5	0,0	35,7	0,0	

Las fases agrupadas indicadoras de actividad (EMS 3 a 8) señaló 99% de las hembras con actividad reproductiva (1 ovario con atresia), de las cuales, 63% se presentó en desarrollo gonadal y 37% en desove (**Tabla 2 y Figura 1**).

Tabla 2

Análisis histológico de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 41.

Semana (N°)	Fecha	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta						Número	
		Incidencia (%)						Activas	Total
2013	Hidratadas	FPO día 0	FPO día 1	FPO día 2	Desarrollo				
23	03/06 - 09/06	0,0	0,0	13,9	13,9	72,3	101	102	
24	10/06 - 16/06	4,8	0,0	14,3	6,8	74,1	147	150	
25	17/06 - 23/06	0,0	0,0	33,3	25,2	41,5	147	150	
26	24/06 - 30/06	0,0	0,0	23,4	6,5	70,1	107	107	
27	01/07 - 07/07	0,0	0,0	22,2	22,2	55,7	158	158	
28	08/07 - 14/07	0,6	0,6	19,0	15,8	63,9	100	158	
29	15/07 - 21/07	6,7	0,0	21,2	15,0	57,0	193	195	
30	22/07 - 28/07	8,6	0,0	12,6	7,1	71,7	198	198	
31	29/07 - 04/08	11,2	0,0	16,2	3,6	69,0	197	202	
32	05/08 - 11/08								
33	12/08 - 18/08	13,4	0,0	15,8	10,3	60,5	253	254	
34	19/08 - 25/08								
35	26/08 - 01/09	9,8	0,0	19,2	7,3	63,6	286	289	
36	02/09 - 08/09								
37	09/09 - 15/09								
38	16/09 - 22/09								
39	23/09 - 29/09	4,6	0,0	40,3	7,1	48,0	196	197	
40	30/09 - 06/10	0,0	0,0	39,5	7,0	53,5	215	215	
41	07/10 - 13/10	1,5	0,0	31,3	4,5	62,6	198	199	




Figura 1 Incidencia semanal de hembras activas (fases agrupadas 3 a 8), año 2011-2013.

En la Zona Norte, el índice de actividad de desove (IAD) en la semana 41 fue **33%**, con **0,5%** de atresia ovocitaria (**Tabla 3**). De acuerdo al comportamiento histórico del IAD (**Figura 2**), los desoves se intensifican en las semanas de julio con registros que se mantienen en valores relativamente altos hasta mediados de octubre (IAD: $\geq 25\%$).

Tabla 3

Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 41.

Semana (N°)	Fecha 2013	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta				
		Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	03/06 - 09/06	6,2	75	13,7	0,0	102
24	10/06 - 16/06	5,6	136	18,7	0,0	150
25	17/06 - 23/06	5,6	120	32,7	0,0	150
26	24/06 - 30/06	7,2	107	23,4	0,0	107
27	01/07 - 07/07	6,6	243	22,2	0,0	158
28	08/07 - 14/07	6,1	232	20,3	0,0	158
29	15/07 - 21/07	6,5	204	27,7	1,0	195
30	22/07 - 28/07	9,2	135	21,2	0,0	198
31	29/07 - 04/08	8,1	380	26,7	2,5	202
32	05/08 - 11/08					
33	12/08 - 18/08			29,1	0,4	254
34	19/08 - 25/08					
35	26/08 - 01/09	7,8	342	28,7	0,7	289
36	02/09 - 08/09					
37	09/09 - 15/09					
38	16/09 - 22/09					
39	23/09 - 29/09	7,5	318	44,7	0,5	197
40	30/09 - 06/10	6,6	232	39,5	0,0	215
41	07/10 - 13/10	6,9	275	32,7	0,5	199




Figura 2 Comportamiento semanal del IAD e IAO en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La línea representa el umbral de IAD de 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).

De acuerdo al comportamiento del índice gonadosomático (IGS) la anchoveta se encuentra con máxima actividad gonadal (**Tabla 3**), destacando en este año IGS que no reflejaron el descenso característico en los meses de otoño (**Figura 3**). A partir de junio el IGS incrementó con un registro por sobre el nivel histórico (IGS mensual 6,1%).




Figura 3 Comportamiento semanal del IGS en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La línea representa el promedio histórico del IGS (referencial del evento reproductivo)).

De los resultados de los indicadores en la **semana 41** se señala prácticamente la totalidad de la anchoveta en desarrollo del evento reproductivo, con ovarios en fases de maduración avanzada y con alta evidencia de desove.

La actividad desove, mediante el IAD, indicó un valor alto (33%), señalando que la anchoveta en la zona norte se mantiene en su periodo de la máxima intensidad de desove (MID: $IAD \geq 25\%$), con desoves que se intensificaron desde fines de julio. Los resultados son concordantes al patrón de desove histórico (IAD) que señala mayor intensidad entre mediados de julio y mediados de octubre, con máximos en las semanas de agosto y septiembre.