



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 39

(XV, I, II REGIONES)

(23 al 29 septiembre 2013)

Convenio I: Asesoría Integral para la Pesca y Acuicultura, 2013

Proyecto 1.10. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / Octubre 2013

REQUIRENTE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretario de Economía
Tomás Flores Jaña

EJECUTOR INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación Pesquera
Jorge Castillo Pizarro

Director Ejecutivo
José Luis Blanco García

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento microscópico de la evolución de la actividad de desove semanal de este recurso, monitoreo que se realiza a través del análisis histológico de muestras de ovarios de ejemplares provenientes de diferentes zonas de pesca. En la semana 23 (3 al 9 junio, 2013) se dio inicio al monitoreo reproductivo de la anchoveta entre la XV y II Región.

Se entregan resultados de 197 hembras muestreadas en la **semana 39** (23 al 29 septiembre, 2013) provenientes de la Zona de Arica (9 millas frente al puerto de Arica y 12 millas de Punta Camarones), Zona de Iquique (12 millas de Punta Chucumata y 13 millas de caleta Molle) y de la Zona de Antofagasta (7 millas de Punta Lautaro).

La distribución de fases microscópicas mostró el predominio de ovarios en condición de desove (EMS 6 a 8), con aporte importante de las fases de desarrollo avanzado (EMS 4 y 5). No se observaron hembras en vitelación inicial (EMS 3) y en regeneración (EMS 2). Los resultados mostraron ovarios con alta incidencia de desove (**Tabla 1**).

Tabla 1

Incidencia de fases microscópicas de madurez de ovarios de anchoveta. Zona Arica-Antofagasta, semana 39.

	Fases ováricas microscópicas									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
n	0	0	0	43	52	9	0	93	0	197
%	0,0	0,0	0,0	21,8	26,4	4,6	0,0	47,2	0,0	

Las fases agrupadas indicadoras de actividad (EMS 3 a 8) señaló prácticamente 100% de las hembras con actividad reproductiva (1 ejemplar con atresia), de las cuales, 48% se presentó en desarrollo gonadal y 52% en desove (**Tabla 2 y Figura 1**).

Tabla 2

Análisis histológico de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 39.

Semana	Fecha	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta							Número	
		Incidencia (%)					Desarrollo	Activas		Total
		Hidratadas	FPO día 0	FPO día 1	FPO día 2					
(N°)	2013									
23	03/06 - 09/06	0,0	0,0	13,9	13,9	72,3	101	102		
24	10/06 - 16/06	4,8	0,0	14,3	6,8	74,1	147	150		
25	17/06 - 23/06	0,0	0,0	33,3	25,2	41,5	147	150		
26	24/06 - 30/06	0,0	0,0	23,4	6,5	70,1	107	107		
27	01/07 - 07/07	0,0	0,0	22,2	22,2	55,7	158	158		
28	08/07 - 14/07	0,6	0,6	19,0	15,8	63,9	100	158		
29	15/07 - 21/07	6,7	0,0	21,2	15,0	57,0	193	195		
30	22/07 - 28/07	8,6	0,0	12,6	7,1	71,7	198	198		
31	29/07 - 04/08	11,2	0,0	16,2	3,6	69,0	197	202		
32	05/08 - 11/08									
33	12/08 - 18/08	13,4	0,0	15,8	10,3	60,5	253	254		
34	19/08 - 25/08									
35	26/08 - 01/09	9,8	0,0	19,2	7,3	63,6	286	289		
36	02/09 - 08/09									
37	09/09 - 15/09									
38	16/09 - 22/09									
39	23/09 - 29/09	4,6	0,0	40,3	7,1	48,0	196	197		




Figura 1 Incidencia semanal de hembras activas (fases agrupadas 3 a 8), año 2011-2013.

En la Zona Norte, el índice de actividad de desove (IAD) en la semana 39 fue 45%, con 0,5% de atresia ovocitaria (Tabla 3). De acuerdo al comportamiento histórico del IAD (Figura 2), los desoves se intensifican en las semanas de julio con registros que se mantienen en valores relativamente altos hasta mediados de octubre (IAD: $\geq 25\%$).

Tabla 3
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 39.

Semana (Nº)	Fecha 2013	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta				
		Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	03/06 - 09/06	6,2	75	13,7	0,0	102
24	10/06 - 16/06	5,6	136	18,7	0,0	150
25	17/06 - 23/06	5,6	120	32,7	0,0	150
26	24/06 - 30/06	7,2	107	23,4	0,0	107
27	01/07 - 07/07	6,6	243	22,2	0,0	158
28	08/07 - 14/07	6,1	232	20,3	0,0	158
29	15/07 - 21/07	6,5	204	27,7	1,0	195
30	22/07 - 28/07	9,2	135	21,2	0,0	198
31	29/07 - 04/08	8,1	380	26,7	2,5	202
32	05/08 - 11/08					
33	12/08 - 18/08			29,1	0,4	254
34	19/08 - 25/08					
35	26/08 - 01/09	7,8	342	28,7	0,7	289
36	02/09 - 08/09					
37	09/09 - 15/09					
38	16/09 - 22/09					
39	23/09 - 29/09	7,5	318	44,7	0,5	197




Figura 2 Comportamiento semanal del IAD e IAO en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La línea representa el umbral de IAD de 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).

De acuerdo al comportamiento del índice gonadosomático (IGS) la anchoveta se encuentra con máxima actividad gonadal (**Tabla 3**), destacando en este año IGS que no reflejaron el descenso característico en los meses de otoño (**Figura 3**). A partir de junio el IGS incrementó con un registro por sobre el nivel histórico (IGS mensual 6,1%).




Figura 3 Comportamiento semanal del IGS en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La línea representa el promedio histórico del IGS (referencial del evento reproductivo)).

De los resultados de los indicadores en la semana 39 se señala prácticamente la totalidad de las hembras en desarrollo del evento reproductivo, con ovarios en fases de maduración avanzada y con alta evidencia de desove.

La actividad desove, mediante el IAD, indicó un valor alto (45%), señalando que la anchoveta en la Zona Norte aún se encuentra en su periodo de la máxima intensidad de desove (MID: $IAD \geq 25\%$), con desoves que se intensificaron desde fines de julio. Los resultados son concordantes al patrón de desove histórico (IAD) que señala mayor intensidad entre mediados de julio y mediados de octubre, con máximos en las semanas de agosto y septiembre.